

PŘÍRODOPIS – 6. TŘÍDA

Zápisy přepsat nebo nalepit so sešitu, vypracovat LIST OPAKOVÁNÍ HMYZ.

Odevzdejte všechny pracovní listy, které jste měli zadány.

BROUCI (S. 92 – 95)

- Kousací ústní ústrojí
- První pár křídel vyztužen chitinem = krovky
- Druhý pár křídel blanitý
- Tykadla článkovaná

Zástupci:

Svižník polní

Střevlíci (měděný, zlatolesklý)

Potápník vroubený

Hrobařík obecný

Páteříček

Světlušky

Slunéčko sedmítečné

Kovařík

Zlatohlávek

Chroust

Tesaříci

Roháč obecný

Chrobák

Mandelinka bramborová

Kůrovci – lýkožrout smrkový

DVOUKŘÍDLÍ (S. 96 – 98)

- Mají jeden pár blanitých křídel
- Druhý pár křídel přeměněn v kyvadélko – udržuje rovnováhu za letu
- Některé druhy jsou užitečné, některé škodlivé i nebezpečné

Komáři

- Velmi tenké nohy
- Ostrý a tvrdý sosák (saje krev)

Pakomáři

- Létají ve velkých rojích nad vodou
- Jejich larvy žijí v bahně na dně tůní a rybníků
- Jsou užiteční – larvy čistí vodu a jsou potravou ryb
- Od komárů se liší dlouhými pýřovitými tykadly

Kuklice

- Užitečný druh
- Larvy zahubí velké množství housenek a larev škodlivého hmyzu

Ovádi

- Zploštělé tělo
- Krátký bodavý sosák
- Nepříjemný a škodlivý hmyz

Roupec

- Velký dravec (loví jiný hmyz)
- výborný letec

Pestřenky

- zbarvením podobné včelám, vosám, čmelákům

Moucha domácí

- nejznámější
- přenašeč mnoha choroboplodných zárodků a tím i nemocí

Masařka

šedavé zbarvení a šachovnicově vybarvený zadeček

Bzučivky

- za letu vydávají silný bzučivý zvuk
- larvy se vyvíjejí v mase

Octomilka obecná

- drobná muška
- vyskytuje se ve velkém množství tam, kde kvasí ovoce

Bodalka tse-tse

- Žije v tropech
- Přenáší prvoka, který vyvolává u dobytka spavou nemoc

Střeček

- Nejrychlejší letec mezi hmyzem
- Parazit krav, jelenů, koní...
- Larvy žijí pod kůží těchto zvířat a způsobují nehojící se boláky

